

## **BIGOPEST®**

Vacina inativada contra a Bronquite infecciosa, Doença de Newcastle e Doença de Gumboro das aves em Adjuvante Oleoso Microemulsionado

### **Uso Veterinário**

#### **Indicações**

Prevenção da Bronquite Infecciosa, Doença de Gumboro e Doença de Newcastle das aves. BIGOPEST® é indicada para vacinação de reprodutoras pesadas em fase final de crescimento, como medida profilática complementar às normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades sanitárias.

#### **Fórmula**

Cada dose de vacina (0,3ml) contém, no mínimo:

Vírus da Bronquite Infecciosa (título antes da inativação)	10 <sup>6,7</sup> DIOE <sub>50%</sub>
Vírus da Doença de Newcastle (título antes da inativação)	10 <sup>8,0</sup> DIOE <sub>50%</sub>
Vírus Doença de Gumboro (título antes da inativação)	10 <sup>5,7</sup> DICT <sub>50%</sub>
Excipiente oleoso microemulsão	0,3 mL

#### **Modo de usar**

Uma dose corresponde a 0,3 ml do produto.

A Vacinação deverá ser realizada entre a 16<sup>a</sup> e 22<sup>a</sup> semana de idade, através da via intramuscular profunda no peito ou na coxa das aves.

Alternativamente, a vacina poderá ser aplicada através da via subcutânea, na região dorsal inferior do pescoço das aves. Se houver necessidade de alterar o esquema de vacinação proposto, seguir as orientações de um Médico Veterinário especializado em avicultura.

#### **Recomendações para um bom manejo de vacinação**

- Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente antes do uso.
- Utilizar somente agulhas, cânulas e equipos limpos e previamente esterilizados.
- Homogeneizar o frasco da vacina antes e durante a administração.
- Somente abrir o frasco imediatamente antes de sua utilização.

#### **Precauções de uso**

Proteger a vacina em exposição direta aos raios solares.

Vacinar somente plantéis em boas condições de saúde.

Não fracionar a dose recomendada.

Evitar a injeção endovenosa do produto.

Não reaproveitar sobras da vacina. Eliminar os frascos após o uso.

Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

Conservar em temperatura entre 2 e 8°C. Não congelar.

#### **Advertências**

Reações teciduais leves e moderadas podem ocorrer se as condições de assepsia no manejo da vacinação não forem observadas ou sob a influência de outros fatores estressantes.

A vacinação não é recomendada em condições ambientais inadequadas (alta umidade e concentração de amônia, cama úmida, stress calórico, etc).

*Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3874 em 10/12/91*

Resp. Técnico: Dr. Emílio C. Salani – CRMV-SP nº 3085

#### **MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA**

Fazenda São Francisco – Paulínia – SP

CNPJ 57 600 249/0001-55 - Indústria Brasileira

Disque MERAL 0800 160909

Número de partida e data de fabricação: vide cápsula de alumínio

Venc: 02 anos após a data de fabricação