

## **BIORAL® H-120**

Vacina Contra Bronquite Infecciosa das Aves

### **Uso Veterinário**

Vacina a vírus atenuado Cepa Massachussetts H-120 produzida em ovos embrionados SPF – Cofal Negativo

### **Indicação**

Prevenção da Bronquite Infecciosa das aves.

### **Doses e Modo de Usar**

- Frangos de corte: uma só aplicação entre 10 a 14 dias de idade.
- Poedeiras: *Primeira vacinação*: entre 10 a 14 dias de idade.  
*Revacinação*: 6ª semana de idade.
- Vacinação de emergência em Poedeiras, recomenda-se o seguinte esquema:
  - Primeira vacinação: entre 10 a 14 dias de idade
  - Segunda vacinação: na 4ª semana
  - Terceira vacinação: na 16ª semana
  - Revacinar a cada 6 meses

Administrar o produto via água de bebida, distribuindo a solução vacinal recém preparada em uma quantidade de água suficiente para ser consumida em duas horas. O volume de água a ser distribuído deve seguir o seguinte esquema:

Esquema Vacinação			
Primeira Vacinação		Segunda Vacinação	
Conteúdo do Frasco	Volume de Água	Conteúdo do Frasco	Volume de Água
100 doses	1 Litro	100 doses	2,5 Litro
500 doses	5 Litro	500 doses	12,5 Litro
1000 doses	10 Litro	1000 doses	25 Litro
2000 doses	20 Litro	2000 doses	50 Litro
3000 doses	30 Litro	3000 doses	75 Litro

### **Observações**

Adicionar a vacina reconstituída ao volume de água, que deverá estar isenta de tratamento com desinfetantes e detergentes e não deverá conter ferro, cloro, nitratos etc. Adicionar 0,2% de leite desnatado (2 g/L), para estabilizar a atividade da vacina. Retirar a água de bebida do lote de aves por aproximadamente 2 horas antes da vacinação. Não utilizar outra água de bebida até que a água contendo a vacina tenha sido totalmente consumida. Os bebedouros devem ser em número suficiente para que todas as aves possam tomar a vacina no menor espaço de tempo, sem haver competição. Os bebedouros devem estar limpos e sem resíduos de sabão, detergentes, desinfetantes ou quaisquer outros produtos químicos que possam ser nocivos à vacina. Carências nutricionais, infecções intercorrentes, doenças parasitárias, estado de "stress", diminuem a capacidade de formação de anticorpos, não produzindo a vacinação, nestas condições, o efeito desejado.

### **Importante**

A vacina Bioral® H-120, somente deve ser preparada no momento de uso, protegendo-a dos raios solares e de altas temperaturas.

### **Advertência**

Reações pós vacinais poderão ser severas desde que as aves sejam portadoras de **Mycoplasma** ou **Haemophilus**.

### **Informação**

A imunidade não estará completa, senão depois de 2 ou 3 semanas e dependerá da idade e grau de imunidade parenteral no momento da vacinação. Utilizar somente o diluente específico fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle da qualidade foram realizadas com o diluente próprio.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 1073 em 11/02/80.

Resp. técnica: Dr. Emílio Carlos Salani – CRMV-SP nº 3085.

Nº da partida e data da fabricação: vide rótulo do frasco.

Data do vencimento: 15 meses após a data da fabricação.

MERIAL Saúde Animal Ltda.

Faz. São Francisco, Paulínia – SP

CNPJ 57.600.249/0001-55 – Indústria Brasileira

**LIGUE GRÁTIS: 0800 160909**