

Cryocell 706

DESCRIÇÃO

Vacina viva congelada contra as Doenças de Marek (HVT cepa FC 126) e Gumboro (cepa S 706).

INDICAÇÕES

Imunização dos pintinhos contra as Doenças de Marek e Gumboro.

COMPOSIÇÃO

Cada dose de vacina contém:

-Fração Marek: Herpesvírus de Peru (HVT cepa FC 126), com título mínimo de 1500 PFU.

-Fração Gumboro (cepa S 706), com título mínimo de 104,0 DICT 50.

RECOMENDAÇÕES

Utilizar seringas, agulhas, cânulas ou equipamentos esterilizados em água fervente, nunca com desinfetantes. Durante a vacinação, agitar o frasco frequentemente.

MODO DE USAR

Via de administração

Administrar a vacina por via subcutânea, na região dorsal do pescoço, injetando 0.2 ml por ave, com o uso de agulha 10 x 8 para seringas manuais e 25 x 8 (20G 1) para vacinadoras automáticas.

Preparo

Preparar a vacina somente à medida em que for necessária a sua utilização.

Abrir o frasco e reconstituir a vacina injetando 3 ml do diluente apropriado, com uma seringa estéril. Aconselha-se o uso de uma agulha 18G x 11/2 para a reconstituição da vacina.

Aspirar o conteúdo vacinal e transferir imediatamente para o frasco de diluente, injetando lentamente a vacina. Enxaguar as paredes do frasco com 3 ml do diluente, visando extrair todo o resíduo de partículas virais. Repetir esta operação uma vez mais.

Agitar o frasco com movimentos suaves, para garantir uma perfeita homogeneização. Desta forma, a vacina estará pronta para uso, devendo ser utilizada imediatamente.

Esquema de vacinação

Vacinar os pintos no 1o dia de vida, no incubatório.

Com relação à fração Marek, uma única aplicação é suficiente para proteger as aves durante toda sua vida econômica. Com relação à fração Gumboro, recomenda-se a revacinação no campo entre a 2a e 3a semana de idade, ou conforme critério do Médico-Veterinário.

APRESENTAÇÃO

Caixas com 10 frascos de 1.000 ou 2000 doses.

CONSERVAÇÃO

Conservar a temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar.

ADVERTÊNCIAS

A vacina administrada à razão de 0,2 ml por dose deve provocar, momentaneamente, a formação de um pequeno nódulo, que indica uma correta inoculação.

Não vacinar aves mal nutridas ou com doenças intercorrentes.

Depois de aberto o frasco, a vacina tem conservação limitada.

Não reaproveitar os frascos após a utilização.

Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos após a data da fabricação.