

## **GALLIMUNE 4**

### INDICAÇÕES

Prevenção de Bronquite Infecciosa, Doença de Newcastle, Doença de Gumboro e Pneumovirose Aviária. Gallimune 4 é indicada para revacinação de reprodutoras pesadas em fase final de crescimento, como medida profilática complementar às normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades sanitárias.

### COMPOSIÇÃO

Cada dose (0,3 mL) contém no mínimo:

Vírus da Bronquite Infecciosa, cepa Mass 41.....	106,7 DIOE50%
Vírus da Doença de Newcastle, cepa Ulster 2C.....	108,0 DIOE50%
Vírus da Doença de Gumboro, cepa VNJO.....	105,7 DICT50%
Vírus da Síndrome da Cabeça Inchada, cepa VC03.....	105,0 DICT50%
Excipiente oleoso q.s.p. ....	0,3 mL

### MODO DE USAR

A vacinação deverá ser realizada entre a 16<sup>a</sup> e 22<sup>a</sup> semana de idade, através da via intramuscular profunda no peito ou na coxa das aves. Se houver necessidade de alterar o esquema de vacinação proposto, seguir a orientação de um Médico Veterinário especializado em avicultura.

### RECOMENDAÇÕES PARA UM BOM MANEJO DE VACINAÇÃO

- Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente antes do uso.
- Utilizar somente agulhas, cânulas, equipos e vacinadoras limpas e previamente esterilizadas.
- Homogeneizar o frasco de vacina antes e durante a administração.
- Somente abrir o frasco imediatamente antes de sua utilização.

### PRECAUÇÕES GERAIS

- Proteger a vacina da exposição direta aos raios solares.
- Vacinar somente plantéis em boas condições de saúde.
- Não fracionar a dose recomendada.
- Não reaproveitar sobras da vacina. Eliminar os frascos após o uso.
- Manter fora do alcance das crianças e animais doméstico.
- Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar.

### ADVERTÊNCIAS

Reações teciduais leves e moderadas podem ocorrer se as condições de assepsia no manejo da vacinação não forem observadas ou sob a influência de outros fatores estressantes.

A vacinação não é recomendada em condições ambientais inadequadas (alta concentração de amônia, cama úmida, aves em condições de estresse calórico, etc).

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9470 em 01/04/09