

GALLIMUNE SE

300 mL (1000 doses)

Vacina inativada oleosa contra infecções por Salmonella enteritidis

Uso Veterinário

Composição

Cada dose de 0,3 ml contém *Salmonella enteritidis*, título mínimo de 3,75 x 10⁹ UFC.

Indicações

Prevenção da salmonelose causada por *Salmonella enteritidis* em aves de postura comercial. Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6786 em 05/03/99

Modo de usar

A primovacinação deverá ser administrada entre a 6^a e a 8^a semanas de idade, através da via intramuscular profunda no peito das aves, na dose de 0,3 ml. A revacinação (dose de reforço) deverá ser realizada entre a 14^a e 16^a semana de idade, através da mesma via. Alternativamente, a vacina poderá ser aplicada através da via subcutânea, na região dorsal inferior do pescoço das aves.

Se houver necessidade de alterar o esquema de vacinação proposto, seguir a orientação de um Médico Veterinário especializado em avicultura.

Recomendações para um bom manejo de vacinação

- Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente antes do uso.
- Utilizar somente agulhas, cânulas e equipos limpos e previamente esterilizados.
- Homogeneizar o frasco de vacina antes e durante a administração.
- Somente abrir o frasco imediatamente antes de sua utilização.

Precauções gerais

- Proteger a vacina da exposição direta aos raios solares.
- Vacinar somente plantéis em boas condições de saúde.
- Não fracionar a dose recomendada.
- Evitar a injeção endovenosa do produto.
- Não reaproveitar sobras de vacina. Eliminar os frascos após o uso.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conservar em temperatura entre 2°C a 6°C. Não congelar.

Restrições de uso

Não utilizar esta vacina nos estabelecimentos avícolas classificados pelo PNSA como de

CONTROLE PERMANENTE.

Advertências

- Reações teciduais leves a moderadas podem ocorrer se as condições de assepsia no manejo da vacinação não forem observadas ou sob a influência de outros fatores estressantes.
- A vacinação não é recomendada em condições ambientais inadequadas (alta umidade e concentração de amônia, cama úmida, stress calórico, etc).
- Os plantéis devem ser monitorados para infecções por *Salmonella pullorum* e *S. gallinarum* antes da vacinação, devido a presença de reações soropositivas cruzadas entre os vários sorotipos de *Salmonella spp.*

Data do vencimento: 02 anos após a data da fabricação.

Produto importado

Fabricante

Merial Italia spa
S.S. 234 per Cremona km. 28,2
Chignolo Po (Pavia) Itália

Representante no Brasil, importador e distribuidor

Merial Saúde Animal Ltda.
Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. técnica: Dr. Emilio C. Salani - CRMV-SP nº 3085