

## **IBD BLEN®**

### **INDICAÇÕES**

Essa vacina contém vírus vivo da doença de Gumboro para a vacinação inicial de frangos de corte sadios com idade de 7 a 14 dias. A água (potável) de bebida, como auxílio na prevenção da doença de Gumboro. É fundamental que as aves sejam mantidas sob boas condições de manejo ambiental e que seja reduzida ao máximo possível a exposição aos vírus da doença.

**Conserve a vacina a 2-7°C. Não congele.**

Não vacine no período de 21 dias antes do abate. Utilize todo o conteúdo do frasco de uma só vez. Incinere o frasco e todo o conteúdo restante não utilizado. Contém gentamicina como agente bacteriostático.

### **ADMINISTRAÇÃO: VACINAÇÃO VIA**

#### **ÁGUA DE BEBIDA**

Recomenda-se o uso da vacinação via água (potável) de bebida em frangos sadios com idade de 7 a 14 dias.

1. Suspenda o uso de todo e qualquer medicamento, detergentes e desinfetante na água de bebida por 72 horas (3 dias) antes da vacinação.
2. Verifique se há quantidade suficiente de bebedouros para que todas as aves possam tomar água ao mesmo tempo.  
Corte o fornecimento de água e deixe as aves consumirem toda a água presente na tubulação.
3. Erga a tubulação de água acima das cabeças das aves. Limpe e enxágüe bem os bebedouros.
4. Antes da vacinação, deixe as aves sem água por no mínimo 2 horas sob clima quente e até 4 horas sob clima fresco, para aumentar a sede. Esse período de retirada deve ser menor se metade do galpão estiver ocupado.
5. Não abra nem misture a vacina até que esteja tudo pronto para a vacinação.
6. A água de bebida para a administração da vacina tem de conter 29 gramas de leite em pó desnatado para cada 3,8 litros de água sem cloro ou deve conter um estabilizante à base de produto lácteo preparado de acordo com as instruções do fabricante.
7. Para cada 1.000 dose, reconstitua a vacina em 11 litros de água com leite sob clima fresco ou 15 litros sob clima quente.
8. Reparta a solução com a vacina nos bebedouros. Evite luz solar direta.
9. Abaixar os bebedouros e deixe as aves tomarem água à vontade. Adicione o resto da solução com a vacina na tubulação à medida que as aves forem bebendo.
10. Não forneça mais água de bebida até que toda a vacina seja consumida.

### **CUIDADOS PRECAUÇÕES**

Não vacine aves doentes.

Vacine de uma só vez todas as aves num determinado local.

Administre no mínimo uma dose por ave.

Evite condições de estresse durante e após a vacinação.

Não coloque as aves em instalações contaminadas.

A exposição à doença deve ser minimizada o máximo possível.

Somente para uso veterinário.

Manter este produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### **AVISO**

As vacinas da Merial Select cumpriram as exigências do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) com relação a inocuidade, pureza e potência.

Esta vacina foi submetida ao teste de Imunogenicidade da Semente Inicial para verificar a eficácia.

### **ADVERTÊNCIA**

A capacidade desta vacina dar resultados satisfatórios depende de vários fatores, entre os quais, mas não somente, se incluem as condições de armazenamento e manuseio por parte dos usuários, a administração da vacina, a saúde e a capacidade de resposta individual de cada ave e o grau de exposição a campo. Portanto, as instruções de uso devem ser cuidadosamente seguidas.

### **APRESENTAÇÕES**

#25 frascos contendo 2000 doses cada um embalados em berços plásticos.

#15 frascos contendo 10.000 doses embalados em berços plásticos.

Resp. Técnica : Dr. Emilio C. Salani CRMV-SP nº 3085

**Validade** : 18 meses após a data de fabricação

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8284 emitida em 09/07/2002

Fabricado por: **MERIAL SELECT**

Gainesville, Georgia 30503 USA

USA Vet. License Nº 279

Representante exclusivo, Distribuidor e Importador no Brasil:

### **Merial Saúde Animal Ltda**

Fazenda São Francisco/ Paulínia-SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Ind. Brasileira

### **USO VETERINÁRIO**