

MYCOVAX® TS-11

Vacina Viva Congelada Contra a Micoplasmose Aviária – Cepa TS-11

Uso Veterinário

INDICAÇÃO

Controle da Micoplasmose aviária em poedeiras comerciais, causada pelo *Mycoplasma gallisepticum*.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DOSE E MODO DE USAR

A vacina deve ser administrada somente pela via ocular, para obter-se uma imunização adequada à ave. Aplicar uma gota de 0,03 mL intraocular, correspondente a uma dose vacinal.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

Aplicar uma dose/ave, via ocular, nas aves com idade entre 5 e 10 semanas de idade. Revacinar somente no período de muda forçada das aves, como reforço de imunidade.

PRECAUÇÕES

- Evitar utilizar esta vacina pela via oral (água) ou nebulização (spray), devido à ausência de disseminação lateral ave à ave (infecção horizontal nula).
- Para um controle correto da Micoplasmose aviária das aves, é importante conhecer a epidemiologia da doença em cada granja, para assim determinar o momento exato da vacinação, ou seja, infectar as aves com a cepa vacinal TS-11 antes da amostra de campo. Este período varia entre 5 e 10 semanas, conforme descrito no programa de vacinação.
- Não utilizar esta vacina nos estabelecimentos avícolas classificados pelo PNSA como CONTROLE PERMANENTE que pratiquem o comércio internacional e interestadual.

CONSERVAÇÃO

Estocagem: manter sob congelamento a – 70°C.

Transporte: a -40°C com gelo seco em caixas de isopor apropriadas. A nível de consumidor final, manter a -20°C em freezer e utilizar no período de 30 dias.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5147 em 27/06/95

Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani – CRMV-SP nº 3085

Nº da partida e data da fabricação: vide rótulo do frasco.

Data do vencimento: 12 meses após a data da fabricação.

MERIAL Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco – Paulínia – SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Indústria Brasileira

LIGUE GRÁTIS: 0800 160909