

POXIBLEN

Uso Veterinário

Indicações

Esta vacina é recomendada como medida profilática auxiliar na prevenção da Encefalomielite e Bouba Aviária. Vacinar somente poedeiras comerciais, matrizes leves e pesadas (aves de reposição) com idade a partir de 10 semanas e até 4 semanas antes do início da produção de ovos, através de punção na membrana da asa.

Administração e Modo de Usar

1. Remover a tampa de plástico destacável para retirar a cápsula de alumínio do frasco de vacina a ser reconstituída. Levantar cuidadosamente a borda da tampa de borracha para permitir entrada de ar e, após a eliminação do vácuo, retirar a tampa.
2. Remover a tampa de plástico destacável para retirar a cápsula de alumínio do frasco de diluente que acompanha a embalagem. Transferir todo o conteúdo do frasco de diluente para o frasco que contém a vacina liofilizada. Fechar o frasco com a tampa de borracha e agitar vigorosamente até obter uma suspensão homogênea.
3. A vacina é administrada com o aplicador que acompanha a embalagem. Mergulhar o aplicador no frasco de vacina e a seguir puncionar a membrana da asa, evitando o contato com as penas da ave, o que pode resultar em perda do líquido vacinal.
4. O aplicador foi desenhado para carregar a quantidade correta de vacina nas ranhuras das agulhas. Após mergulhar na vacina, tocar suavemente o aplicador na borda da superfície interior do frasco para eliminar eventual excesso de vacina e evitar gotejamento pelas agulhas. Repetir este procedimento para cada aplicação.

Precauções

- Não vacinar aves enfermas.
- Vacinar todas as aves do lote.
- Não fracionar a dose recomendada.
- Usar todo o conteúdo da vacina em até 4 horas após a abertura do frasco.
- Evitar condições de stress durante e após a vacinação.
- Queimar o frasco após o uso e todo conteúdo não utilizado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Advertência

O controle de eficiência da vacinação deve ser realizado de 7 a 10 dias após a administração, através do exame de "pega vacinal". Uma reação de "pega" evidente é caracterizada por edema no ponto de inoculação e formação de pústulas ou crostas na pele, significando que um bom manejo de vacinação foi realizado. As crostas desprendem-se em cerca de 2-3 semanas após a vacinação. Se a reação de "pega" vacinal não for observada, isto pode significar que as aves estavam imunes contra a Bouba Aviária, que o procedimento de vacinação foi insatisfatório, ou que houve perda de potência vacinal devido à transporte ou conservação inadequada.

Observações

Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante desta vacina visto que todas as provas de controle da qualidade foram realizadas utilizando-se o diluente próprio.

Apresentação

Estojo contendo 25 frascos com 1000 doses de vacina liofilizada. O diluente apresenta-se em frascos contendo 10 mL embalados separadamente em estojos com 25 unidades e mais 10 aplicadores.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7328 em 23/05/2000 .

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação de Médico Veterinário.

Conservar em temperatura entre 2°C e 7°C.

Não congelar.

Proprietário e fabricante:

Merial Select, Inc.

Gainesville, GA - USA

U.S. Vet. Lic. nº 279

Representante no Brasil e importador:

Merial Saúde Animal Ltda

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55 - Indústria Brasileira

Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani - CRMV-SP nº 3085

Produto importado