

SHS-K

Vacina inativada contra a Síndrome da Cabeça Inchada (SHS) das aves em adjuvante oleoso

Uso Veterinário

Conteúdo: 450 mL (1500 doses)

Composição

Cada dose de vacina (0,3 mL) contém:

- Vírus inativado da Síndrome da Cabeça Inchada, cepa Vc03, título mínimo antes da inativação 10^{5,0} DICT₅₀
- Excipiente oleoso q.s.p.0,3 mL

Indicação

Prevenção da Síndrome da Cabeça Inchada (Rinotraqueíte Infecciosa) das aves. **SHS-K** é indicada para vacinação de reprodutoras e aves de postura previamente imunizadas com vacinas a vírus vivo no período que antecede a produção de ovos férteis e comerciais, ou como reforço da imunidade durante o ciclo produtivo.

Doses e Modo de Usar

- Aplicar 0,3 mL do produto por via intramuscular (músculo do peito) entre a 16^a e 22^a semana de idade ou conforme orientação do Médico Veterinário.
- Administrar a vacina preferencialmente nas horas mais frescas do dia.
- Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente no momento da aplicação.
- Agitar o frasco antes de usar e periodicamente durante a vacinação.
- Utilizar equipamentos (seringas, agulhas e equípos) desinfetados.
- Poderá ser recomendado um programa alternativo com duas doses, sendo a primeira entre a 8^a e 10^a semana de idade e a segunda entre a 13^a e 15^a semana de idade.
-

Advertências

- Vacinar somente plantéis em boas condições de saúde.
 - Conservar o produto sob refrigeração em temperatura entre 2°C a 8°C.
 - Não congelar.
 - Evitar vacinar as aves 30 dias antes do abate.
 - Não reaproveitar sobras do produto e frascos vazios.
 - Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani – CRMV-SP nº 3085

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4333 em 18.06.93

Nº da partida e data da fabricação: vide cápsula de alumínio.

Vencimento: 02 anos após a data da fabricação.

MERIAL Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco – Paulínia – SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Indústria Brasileira

LIGUE GRÁTIS: 0800 160909