

YOKEI-5

Vacina Inativada Contra a Bronquite Infecciosa, Doença de Newcastle, Síndrome da Queda de Postura (EDS-76) e Coriza Infecciosa das Aves (Cepas 221 e H18) em Adjuvante Oleoso Microemulsionado

Uso Veterinário

Conteúdo 450 mL (1500 doses)

INDICAÇÕES

Prevenção da Bronquite Infecciosa, Doença de Newcastle, Síndrome da Queda de Postura (EDS-76) e Coriza Infecciosa das Aves. É indicada para revacinação de reprodutoras e aves de postura em fase final de crescimento, como medida profilática.

FÓRMULA

Cada dose (0,3 mL) contém, no mínimo:

Vírus da Bronquite Infecciosa (título antes da inativação).....	10 ^{6,7} DIOE _{50%}
Vírus da Doença de Newcastle (título antes da inativação)	10 ^{8,0} DIOE _{50%}
Vírus da Síndrome da Queda de Postura (título antes da inativação)	10 ^{6,0} DICT _{50%}
<i>Haemophilus paragallinarum</i> , sorotipo HA-1 (cepa 221).....	2,5 x 10 ⁹ germes
<i>Haemophilus paragallinarum</i> , sorotipo HA-4 (cepa H18)	2,5 x 10 ⁹ germes
Veículo q.s.p.	0,3 mL

MODO DE USAR

A vacinação deverá ser realizada a partir da 12^a semana de idade (poedeiras comerciais) ou entre a 16^a e 22^a semana de idade (reprodutoras pesadas), através da via intramuscular profunda no peito ou na coxa das aves. Alternativamente, a vacina poderá ser aplicada através da via subcutânea, na região dorsal inferior do pescoço das aves.

Se houver necessidade de alterar o esquema de vacinação proposto, seguir a orientação de um Médico Veterinário especializado em avicultura.

RECOMENDAÇÕES PARA UM BOM MANEJO DE VACINAÇÃO

- Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente antes do uso.
- Utilizar somente agulhas, cânulas e equipos limpos e previamente esterilizados.
- Homogeneizar o frasco de vacina antes e durante a administração.
- Somente abrir o frasco imediatamente antes de sua utilização.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Proteger a vacina da exposição direta aos raios solares.
- Vacinar somente plantéis em boas condições de saúde.
- Não fracionar a dose recomendada.
- Evitar a injeção endovenosa do produto.
- Não reaproveitar sobras da vacina. Eliminar os frascos após o uso.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C. Não Congelar.

ADVERTÊNCIAS

Reações teciduais leves a moderadas podem ocorrer se as condições de assepsia no manejo da vacinação não forem observadas ou sob a influência de outros fatores estressantes.

A vacinação não é recomendada em condições ambientais inadequadas (alta umidade e concentração de amônia, cama úmida, stress calórico, etc).

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3739 em 23/05/91

Apresentação: frasco-ampola de plástico contendo 450 mL.

MERIAL Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco – Paulínia – SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Indústria Brasileira

Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani – CRMV-SP nº 3085

Número da partida e data da fabricação: vide cápsula de alumínio.

Data do vencimento: 02 anos após a data da fabricação.

LIGUE GRÁTIS: 0800 160909

