

Yokei-3

DESCRIÇÃO

Vacina inativada contra a Bronquite Infecciosa, Doença de Newcastle e Síndrome da Queda de Postura das aves em adjuvante oleoso.

INDICAÇÕES

Prevenção da Bronquite Infecciosa, Doença de Newcastle e Síndrome da Queda da Postura das aves. YOKEI-3 é indicada para vacinação de reprodutoras e aves de postura antes da produção de ovos férteis e comerciais, previamente imunizadas com vacinas a vírus vivo ou como reforço da imunidade durante o ciclo produtivo.

COMPOSIÇÃO

Cada dose de vacina (0,3ml) contém:

- Vírus inativado da Bronquite infecciosa, cepa H52, título mínimo antes da inativação de 106,7 DIE50
- Vírus inativado da Doença de Newcastle, cepa LaSota, título mínimo antes da inativação de 108,0 DIE50
- Vírus inativado da Síndrome da Queda da Postura, cepa V-127, título mínimo antes da inativação de 106,0 DICT50

RECOMENDAÇÕES

Utilizar equipamentos (seringas, agulhas e equipos) desinfetados.

Não utilizar seringas com pistão de borracha.

MODO DE USAR

Via de administração

Aplicar 0,3 ml do produto por via intramuscular (músculo do peito) ou subcutânea (base do pescoço).

Preparo

Agitar o frasco antes de usar e periodicamente durante a vacinação.

Administrar a vacina em temperatura ambiente e preferencialmente nas horas mais frescas do dia.

Esquema de vacinação

Vacinar entre a 16a e 22a semana de idade ou conforme orientação do Médico-Veterinário.

APRESENTAÇÃO

Frascos de 450 ml (1.500 doses).

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto sob refrigeração a temperatura entre 2 e 8°C.

Não congelar.

ADVERTÊNCIAS

- Não vacinar aves mal nutridas ou com doenças intercorrentes.
- Depois de aberto o frasco, a vacina tem conservação limitada.
- Não vacinar as aves nos 30 dias que antecedem ao abate.
- Não reaproveitar os frascos após a utilização.
- Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a contar da data de fabricação.